

W związku z jesiennym okresem migracji dzikich ptaków oraz pojawieniem się nowych ognisk choroby ptasiej grypy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na terenie województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni przypomina gospodarstwom utrzymującym drób o zachowaniu szczególnych środków biasekuracyjnych. W ramach podejmowanych działań, powinni:

Ø utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;

Ø zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie jest utrzymywany drób lub inne taki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach inwentarskich;

Ø przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;

Ø zabezpieczyć słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywana w zamkniętych pomieszczeniach, po zadaszeniu itp.);

Ø karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

Ø regularnie dokonywać przeglądu budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych) i eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności;

Ø utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Ø w miarę możliwości powstrzymywać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć już istniejące przed dostępem dzikiego ptactwa;

Ø powstrzymać się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);

Ø przestrzeganie wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób oraz stałego utrzymywania ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

Ø przestrzeganie stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;

Ø przestrzeganie stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;

Ø przestrzeganie oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;

Ø przestrzeganie nakazu dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności;

Ø powiadamiania organu IW albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Ponadto, w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt miała miejsce w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym. Osoby takie powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, co najmniej 48 godzin od uczestnictwa w polowaniu na ptaki łowne,.

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków nieasekuracyjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Bochni

Wacław Czaja